

## О случаях дифтерии в Украине

По информации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины за 10 месяцев текущего года в стране зарегистрировано 9 случаев дифтерии (Черниговская, Киевская, Луганская области, г. Запорожье и Мелитопольский район). В течение прошлого 2017 года случаи дифтерии не регистрировались.

По мнению специалистов, ситуация связана с крайне низким охватом населения профилактической иммунизации. Основной причиной называют длительный отказ родителей от вакцинации детей. Охват иммунизацией в различных возрастных группах детей за 9 месяцев текущего года в Украине составляет 40% при нормируемом показателе Всемирной организации здравоохранения – не менее 95%. Прогноз развития ситуации не благоприятный.

Дифтерией болеют исключительно люди, от домашних и диких животных или птиц заразиться нельзя. Основным способом передачи инфекции является воздушно-капельный, то есть при разговоре, чихании. В некоторых случаях возможны контактно-бытовые пути заражения – загрязненные предметы быта, посуда, грязные руки.

Опасность заключается в том, что на ранних стадиях симптомы дифтерия и ангины очень схожи – в горле образуются пленки. У человека наблюдается повышенная температура, затрудненное дыхание и глотание. Уже с первых секунд палочка Леффлера (возбудитель дифтерии) попадая в организм начинает выделять опасный токсин, который попадает в кровь, а затем в ткани почек, сердца и нервной системы, именно в этих тканях развивается поражение. Возможен отек шеи.

Основным методом профилактики на сегодняшний день является вакцинация детей начиная с трехмесячного возраста и согласно графику прививок. Кроме того, каждые 10 лет проводится ревакцинация АДС - вакциной для поддержания антитоксического иммунитета от столбняка и дифтерии.

Межрегиональное управление № 120 ФМБА России просит учитывать данную информацию при планировании поездок, обратив внимание на важность наличия прививки против дифтерии.

---